

پیش‌بینی قیمت ماهانه یک گوشتی در استان آذربایجان شرقی

1

تاریخ پذیرش 1390/10/21

تاریخ دریافت: 1389/9/4

چکیده

داری گوشتی یکی از مجموعه بخش کشاورزی ایران است. فعالیت در پرورش مرغ گوشتی همراه با مخاطرات زیادی است. مخاطراتی هم چون خطریزبری تولید و خطرپذیری بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می‌باشد. در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان‌های قیمت جو یک گوشتی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، الگوسازی و پیش‌بینی قیمت ماهانه یک گوشتی در استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور، رفتار قیمت یک گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهای پایه یونی منکی بر آزمون ریشه واحد فصلی و باکس-جنکیز فصلی با استفاده از داده‌های قیمت ماهانه یک گوشتی طی سال 1377-88 تحلیل شد. نتایج آزمون ریشه‌ی واحد فصلی بیان گر آن است که قیمت ماهانه یک گوشتی از فرآیند تصادفی نالیستاً فصلی تبعیت می‌نماید، و بر این اساس به کارگیری مدل پایه‌ی رگرسیونی برای تدوین الگوی پیش‌بینی قیمت مناسب است. مقایسه میزان درستی پیش‌بینی مدل‌های پایه‌ی رگرسیونی و خودتوضیحی هم میانگین متحرک فصلی بر اساس معیار RMSE، حاکی از برتری مدل پایه‌ی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش‌بینی مقادیر قیمت یک گوشتی در نهایت قیمت ماهانه یک گوشتی در استان آذربایجان شرقی برای سال 1389-90 پیش‌بینی گردید.

Q14 C53 C22 :JEL

های کلیدی: تغییر فصلی، آزمون ریشه واحد فصلی، SARIMA، پیش‌بینی قیمت

ستادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

E-mail: Ghahremanzadeh@Tabrizu.ac.ir

داری گوشتی یکی از فعالیت‌های عمدۀ بخش کشاورزی ایران محسوب می‌باشد. این صنعت با تولید بیش از 1565 هزار تن گوشت مرغ نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز کشور به عهده دارد (وزارت جهاد کشاورزی، 1388). اما فعالیت در پرورش مرغ گوشتی چه در ایران و چه در دیگر نقاط دنیا سرشار از مخاطرات است. مخاطراتی هم خطرپذیری تولید^۱ و خطرپذیری بازار^۲ باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می‌باشد. این بی‌اطمینانی از درآمدهای آینده، تولید را در کوتاه مدت مشکل و برنامه‌ریزی درازمدت را پیچیده می‌کند (سلامی و همکاران، 1388).

در چند سال اخیر، نوسان‌های قیمتی به یکی از مشکلات اصلی صنعت مرغ‌داری گوشتی کشور تبدیل شده است، به‌طوری که شرکت پشتیبانی امور دام کشور، موسسه ریزی و اقتصاد کشاورزی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه داری گوشتی کشور اذعان دارند که یکی از مشکلات اصلی و بحران گوشتی، وجود نوسان‌های قیمتی زیاد در بازار گوشت مرغ است (1387). در این میان، یکی از دلایل اصلی نوسان‌های تولید گوشت مرغ و به تبع آن قیمت گوشت مرغ در کشور، نوسان‌های قیمت جوجه‌ی یک‌گوشتی است. به‌طوری که این نوسان‌های قیمتی همراه تولیدکنندگان جوجه‌ی یک‌روزه گوشتی و پرورش دهنده‌گان مرغ گوشتی را آزار داده و ریزی تولید را برای آن‌ها پیچیده و مشکل نموده است (1387). در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا رفتار قیمت جوجه‌ی یک‌گوشتی را در استان آذربایجان شرقی الگوسازی نماید. نتایج این مطالعه می‌تواند ابزار مفیدی در اختیار تولیدکنندگان جوجه‌های گوشتی این استان و هم‌چنان دهنده‌گان مرغ گوشتی قرار دهد تا بتوانند با پیش‌بینی قیمت‌های آینده ریزی تولید خود را بهبود

¹. Production risk

². Market risk

ین، با استفاده از نتایج این مطالعه، بخش‌های اجرای دولت می‌توانند قیمت یک گوشتی را برای سال آینده پیش‌بینی کنند و در این خصوص ریزی و سیاست‌گذاری کنند. این مساله به نوبه خود می‌تواند موجبات کاهش های قیمت گوشت مرغ و در نتیجه افزایش رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مرغ گوشتی را فراهم آورد.

یکی از کاربردی‌ترین روش‌های پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی به ویژه قیمت، استفاده زمانی است. کارگیری هر یک از تکنیک‌های سری زمانی بستگی به ماهیت متغیر سری زمانی مورد مطالعه دارد. بررسی صورت گرفته در خصوص مطالعات داخل کشور (قهرمانزاده و سلامی، 1387) نشان می‌دهد که کم‌تر به بررسی ماهیت تغییرات فصلی قیمت کالاهای کشاورزی یک گوشتی و الگوسازی رفتار این قیمت توجه به این ماهیت برای پیش‌بینی مقادیر آینده که شناسایی و تحلیل ماهیت واقعی رفتار فصلی قیمت جوجهی یک گوشتی، به قابل انتظاری می‌تواند پیش‌بینی مقادیر آینده این سری را در مطالعات تجربی بهبود ببخشد. از این رو، انتظار می‌رود بررسی این جنبه از رفتار قیمت جوجهی یک گوشتی و الگوهای پیش‌بینی مناسب با آن به توسعه ادبیات موضوع در کشور کمک نماید که این امر مهم یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر است.

برخی از محققان نیز تلاش نموده‌اند تا مقادیر آینده قیمت‌ها را در بازار مرغ پیش‌بینی نمایند. برای نمونه، کشاورز حداد (1385) قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در استان های شاخص قیمت خردۀ فروشی ماهانه در دوره 84:02 – 1369:01 پیش‌بینی نموده است. در این مطالعه، با استفاده از آزمون ریشه واحد فصلی خصوصیات ایستایی سری قیمت یادشده مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به ایستابودن قیمت یادشده در سطح داده‌ها، برای پیش‌بینی قیمت‌ها از روش خودتوضیحی

میانگین متحرک^۱ (ARMA) معمولی استفاده شده است و در مورد دیگر الگوهای پیش‌بینی های زمانی فصلی مانند الگوهای خودتوضیحی دوره‌یی^۲، پایه‌یی رگرسیونی^۳ و متغیرهای مجازی فصلی بحثی صورت نگرفته است.

قهرمانزاده و سلامی (1387)، اقدام به تدوین الگویی برای پیش‌بینی قیمت ماهانه برای این منظور، از تکنیک‌های سری زمانی در قالب الگوهای خودتوضیحی دوره‌یی (PAR)، پایه‌یی رگرسیونی بر پایه آزمون‌های ریشه‌ی واحد فصلی و باکس – جنکینز (SARIMA) . های این تحقیق نشان داد که قیمت‌گوشت مرغ دارای تغییرات دیجیتال نیست و نمی‌پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده نمود و مقایسه میزان درستی پیش‌بینی‌ها حاکی از برتری مدل پایه‌یی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش‌بینی مقادیر قیمت

روش تحقیق

استفاده از تکنیک ری زمانی برای الگوسازی رفتار یک سری مستلزم شناسایی ماهیت آن سری زمانی است. معمولاً یک سری زمانی شامل مؤلفه‌های روند زمانی^۴، حرکت پیش‌بینی^۵، تغییرات فصلی و مؤلفه غیر منظم^۶ (لیم و مک‌آلیر، 2000 و کوک و آلتینی، 2007). کاهش یا افزایش بلندمدت یک سری زمانی است. یعنی، مربوط به حرکت چرخه غیرمنظم یک سری، یک جزء تصادفی است که ناشی از اتفاق‌های نامعمول و پیش‌بینی‌ناپذیر است.

¹. Autoregressive Moving Average (ARMA)

². Periodic Autoregressive Model

³. Regression – Based Model

⁴. Trend

⁵. Cyclical movements

⁶. Irregular

مهم دیگر یک سری زمانی، تغییرات فصلی آن است. برای یک سری زمانی همانند قیمت ماهانه یک ی گوشتی، تغییر شرایط آب و هوا، تقاضای فصلی کنندگان گوشت مرغ، وجود مناسبت‌های مذهبی و اعیاد، عرضه فصلی جوجه یک ی گوشتی و کوتاه بودن دوره تولید مرغ گوشتی، از جمله عواملی است که باعث فصلی بودن این سری‌های قیمت می‌ . الگوی پیش‌بینی این گونه سری‌های زمانی می‌بایست این مولفه (تغییرات فصلی) .

اخیر، بهویژه بعد از مطالعه هیلبرگ و همکاران (1990)، ادبیات مربوط به این خصوصیات این مولفه در الگوسازی رفتار های زمانی توسعه زیادی یافته (1991؛ بولیو و مایرن، 1993؛ هیلبرگ، 1995؛ قیسلز و همکاران، 2004؛ کانوا و 1994؛ 1995؛ تیلور، 1998؛ رودریگز و آزبورن، 1999 و رودریگز و فرانسیس، 2005). رفتار فصلی یک سری زمانی مثلاً سری قیمه‌یک ی گوشتی می‌تواند به صورت یک فرآیند فصلی قطعی¹ یا تصادفی² (دارن و دایبلت، 2002). یک مولفه فصلی تصادفی را، یک فرآیند ریشه واحد فصلی یا فرآیند فصلی تصادفی نایستا³ می‌ (قیسلز و آزبورن، 2001). پس از تشخیص وجود چونین فرآیندی، برای الگوسازی و پیش‌بینی رفتار سری زمانی ابتدا می‌بایست از فیلتر گیری فصلی یا معمولی و یا هر دو، برای ایجاد سری‌های زمانی ایستا استفاده نمود. سپس رفتار سری زمانی را توسط روش یی یافت باکس و جنکینز فصلی (1976) و الگوی پایه - رگرسیونی الگوسازی کرد و از این راه مقادیر آینده سری را پیش‌بینی نمود. یکی از راه‌های شناسایی وجود فرآیند فصلی تصادفی نایستا در سری زمانی انجام آزمون ریشه‌ی واحد فصلی⁴ . هیلبرگ و همکاران (1990) برای اولین بار آزمون ریشه

¹. Deterministic Seasonal Process

². Stochastic Seasonal Process

³. Non-stationary stochastic seasonality

⁴. Seasonal unit root test

فصلی و غیرفصلی را برای سری مانی فصلی سه ماهه ارائه نمودند، که بعداً توسط بولیو و مایرن (1993) های زمانی ماهانه بسط داده شد. فرض کنید P_t یک سری زمانی ماهانه مانند سری قیمت ماهانه ε_t یک گوشتی باشد که رفتاری منطبق با فرآیند خودتوضیحی ماهانه زیر :

$$\varphi(L)P_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \mu_t = \alpha + \beta t + \sum_{s=1}^{11} \delta_s D_{s,t} \quad (1)$$

که $\varphi(L)$ یک چند جمله‌یی L همان تعريف قبلی $\varphi(L) = 1 - L^{12}$ است. μ_t یک فرآیند نویه سفید، ε_t یک فرآیند نویه سفید است. $D_{s,t}$ روند خطی (t) و متغیرهای موہومی فصلی ماهانه ($D_{s,t}$) را در $\varphi(L) = 1 - L^{12}$ بروی یک چرخه واحد است که این ریشه (تیلور، 1998) :

$$\pm 1; \pm i; -\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{3}i); \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{3}i); -\frac{1}{2}(\sqrt{3} \pm i); \frac{1}{2}(\sqrt{3} \pm i) \quad (2)$$

$i = \sqrt{-1}$

ترتیب در فراوانی $0, \pm \frac{\pi}{6}, \pm \frac{5\pi}{6}, \pm \frac{\pi}{3}, \mp \frac{2\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$ است و هر یک از ریشه

می. از این مجموعه، اولین ریشه، یعنی $+1$ ، ریشه‌ی واحد غیرفصلی است که در فراوانی صفر، یعنی بدون تکرار در طول یک سال اتفاق می‌افتد و به ریشه‌ی واحد فراوانی صفر¹ (تیلور، 1998). بقیه، ریشه‌های واحد فصلی است که به ترتیب در $6, 9, 3, 8, 4, 11, 10, 7, 5, 1, 2$ چرخه در یک سال اتفاق می‌پس سری زمانی P_t می‌تواند هر یک از ریشه‌های فوق و یا مجموعه‌یی i را داشته باشد و نوع ریشه () خواهد کرد که چگونه سری زمانی یادشده می‌باشد ایستا شود. بنابراین، باید ابتدا نوع ریشه‌ی واحد شناسایی شود. بولیو و مایرن (1993) گیری از تجزیه ریشه

¹. Zero-frequency unit root

اند که برای آزمون ریشه‌های واحد فصلی و غیرفصلی می‌گیری فصلی^۱ رگرسیونی (3).

$$(1 - L^{12})P_t = \alpha + \sum_{s=1}^{11} \delta_s D_{s,t} + \beta t + \sum_{i=1}^{12} \pi_i y_{i,t-1} + \sum_{j=1}^p \phi_j (1 - L^{12})P_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3)$$

که $D_{s,t}, \alpha, t$, همان تعاریف قبلی خود را دارد، p تعمیم معادله (3) برای تامین خصوصیت نوافه سفید اجزای اخلال معادله (ε_t) است که در هر کدام از آن‌ها یکی از ریشه‌های واحد در فراوانی مربوط نگه مطابق تعریف بولیو و مایرن در زیر آمده است.

و بقیه ریشه‌های واحد در دیگر فراوانی متغیرهای $y_{i,t}$ شیوه .

^۱: برای این منظور می‌توان از رهیافت تجزیه ریشه‌های واحد تفاضل فصلی $\varphi(L) = 1 - L^{12}$ به شکل زیر استفاده نمود (رودریگز و آربورن، 1999):

$$(1 - L^{12}) = (1 - L)(1 + L)(1 - i\sqrt{3}L)(1 + i\sqrt{3}L) \times \left[1 - \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}L) \right] \left[1 - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}L) \right] \left[1 + \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}L) \right] \left[1 + \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}L) \right]$$

$$\left[1 - \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)L \right] \left[1 - \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)L \right] \times \left[1 + \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)L \right] \left[1 + \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)L \right]$$

$$\begin{aligned}
y_{1t} &= (1 + L + L^2 + L^3 + L^4 + L^5 + L^6 + L^7 + L^8 + L^9 + L^{10} + L^{11})P_t, \\
y_{2t} &= -(1 - L + L^2 - L^3 + L^4 - L^5 + L^6 - L^7 + L^8 - L^9 + L^{10} - L^{11})P_t, \\
y_{3t} &= -(1 - L^3 + L^5 - L^7 + L^9 - L^{11})P_t, \\
y_{4t} &= -(1 - L^2 + L^4 - L^6 + L^8 - L^{10})P_t, \\
y_{5t} &= -\frac{1}{2}(1 + L - 2L^2 + L^3 + L^4 - 2L^5 + L^6 + L^7 - 2L^8 + L^9 + L^{10} - 2L^{11})P_t, \\
y_{6t} &= \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - L + L^3 - L^4 + L^6 - L^7 + L^9 - L^{10})P_t, \\
y_{7t} &= \frac{1}{2}(1 - L - 2L^2 - L^3 + L^4 + 2L^5 + L^6 - L^7 - 2L^8 - L^9 + L^{10} + 2L^{11})P_t, \\
y_{8t} &= -\frac{\sqrt{3}}{2}(1 + L - L^3 - L^4 + L^6 + L^7 - L^9 - L^{10})P_t, \\
y_{9t} &= -\frac{1}{2}(\sqrt{3} - L + L^3 - \sqrt{3}L^4 + 2L^5 - \sqrt{3}L^6 + L^7 - L^9 + \sqrt{3}L^{10} - 2L^{11})P_t, \\
y_{10t} &= \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}L + 2L^2 - \sqrt{3}L^3 + L^4 - L^6 + \sqrt{3}L^7 - 2L^8 + \sqrt{3}L^9 - L^{10})P_t, \\
y_{11t} &= \frac{1}{2}(\sqrt{3} + L - L^3 - \sqrt{3}L^4 - 2L^5 - \sqrt{3}L^6 - L^7 + L^9 + \sqrt{3}L^{10} + 2L^{11})P_t, \\
y_{12t} &= -\frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}L + 2L^2 + \sqrt{3}L^3 + L^4 - L^6 - \sqrt{3}L^7 - 2L^8 - \sqrt{3}L^9 - L^{10})P_t.
\end{aligned} \tag{4}$$

(3) در هر یک از 12 $y_{i,t}$ به ترتیب براساس حفظ یکی از ریشه

() و حذف دیگر ریشه‌های واحد تولید می (). به عنوان مثال، در ایجاد

$y_{1,t}$ ، ریشه‌ی واحد در فراونی صفر (1+) در معادله باقی و بقیه ریشه‌های در دیگر

اند؛ در حالی که ایجاد سری $y_{2,t}$ ، فقط بر پایه حفظ ریشه

فراونی π () و حذف بقیه ریشه‌ها در دیگر فراونی است و بدین

ترتیب دیگر سری $y_{i,t}$ نیز ایجاد شده (بنابراین، از لحاظ آماری، معنی

π_i ، بیان‌گر وجود ریشه‌ی واحد در فراونی مربوطه).

گیری از آزمون BM، ابتدا می‌بایست وقفه‌ی بهینه p ، یعنی تعداد

(4) تعیین گردد. برای این منظور، مطابق رهیافت

36) (3) (p_{max}) (2004)

() برآورد می (). سپس با استفاده از آزمون خودهمبستگی LM وجود خودهمبستگی

سریالی از درجه (LM(12))، یعنی خودهمبستگی فصلی، در اجزای

برآورده شده مورد سنجش قرار می‌گیرد، و اگر آماره‌ی این آزمون از لحاظ آماری معنی نباشد، یک عدد از تعداد وقفه‌ها کاسته و دوباره معادله برآورده می‌شود. این عمل تا جایی تکرار می‌شود که آماره‌ی آزمون معنی نباشد. به عبارت دیگر اگر آزمون آمار LM(12)

k عدد تعیین می‌شود.

که تعداد وقفه‌ی مناسب اولیه (k) تعیین شد، با به کارگیری آزمون‌های کترل تشخیصی اجزای اخلال، اعتبار و خوبی برآش الگوی نهایی مورد سنجش واقع می‌شود.

های کترل تشخیصی شامل آزمون خودهمبستگی سریالی LM

(ARCH(1))، آزمون واریانس ناهمسانی شرطی از درجه

¹. (ARCH(12))

پس از تعیین تعداد وقفه‌ی بهینه، می‌بایست معادله (3) را با استفاده از روش کمترین مربعات معمولی (OLS)

π_i سپس باید آزمون معنی

F^2 سنجیده. فرضیه‌ی عدم مبنی بر وجود ریشه‌ی واحد در فراوانی

خاص در برابر فرضیه‌ی گرینه‌ی ایستا بودن در این فراوانی مورد آزمون قرار می‌گیرد.

$H_{k_0} : \pi_k = 0$ ن وجود ریشه‌های واحد در فراوانی صفر و π ، فرضیه

برخی از مطالعات از جمله بسویچ و فرانسیس (1995)، روذریگز و آزبورن (1996) همکاران (1999) F برای انجام آزمون خودهمبستگی سریالی LM

کردند. به طور کلی، آزمون LM به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$LM = \frac{N - k^* - l}{l} \times \frac{RSS_r - RSS_u}{RSS_u} \sim F(l, N - k^* - l)$$

که در آن، N تعداد ضرایب برآورده شده در معادله‌ی رگرسیون مقید، l

کارگرفته شده در معادله رگرسیون نامقید، RSS_r RSS_u به ترتیب مجموع

رگرسیون مقید و نامقید است (روذریگز و آزبورن، 1999).

F محاسباتی دارای توزیع استاندارد F ترتیب عدد

$F(l, N - k^* - l)$ است که l برای آزمون خودهمبستگی سریالی از داده

ی حاضر نیز همانند تحقیقات پادشاه از آماره LM F 12 1

مقادیر بحرانی این آماره‌ها حالت استاندارد ندارد و توسط خود بولیو و مایرن (1993) ایجاد شده

$k=1,2$ طور جداگانه در برابر فرضیه‌ی گزینه $H_{k1} : \pi_k < 0$ $k=1,2$ یک طرفه سنجیده می‌شود. ای آزمون وجود ریشه‌های واحد فصلی t مرکب¹، فرضیه $H_{k2} : \pi_k = \pi_{k+1} = 0$ در برابر فرضیه‌ی گزینه $H_{k3} : \pi_k = \pi_{k+1} \neq 0$ مبنی بر وجود دست‌کم یک ریشه‌ی واحد فصلی مخالف صفر (F) ($k=3,5,7,9,11$) فرضیه $\pi_1 = \pi_2 = 0$, $\pi_3 = \pi_4 = 0$, $\pi_5 = \pi_6 = 0$, $\pi_7 = \pi_8 = 0$, $\pi_9 = \pi_{10} = 0$ به ترتیب دلالت بر وجود ریشه‌ی واحد در فراوانی F زمانی متغیر P_t بیان‌گر وجود ریشه $F_{k,k+1}$ در t_k آماری هر یک اوانی مربوط است که برای خارج نمودن این ریشه از سری باید فیلتر تفاضل‌گیری مرتبط با آن اگر بیش از یک ریشه‌ی واحد در سری زمانی ظاهر گردد، می‌بایست از ضرب فیلترهای تفاضل‌گیری مربوط برای ایستاسازی استفاده شود.⁴ در حقیقت، از این باشتگی فصلی⁵ P_t مشخص می‌شود. براساس تعریف انگل (1989) یافته BM، زمانی متغیر قیمت ماهانه P_t در فراوانی صفر باشد، همانباشتگی استاندارد به می‌آید. علاوه بر این، یک سری می‌دریگند فراوانی هم (برنداستراپ و همکاران، 2004).

برای مثال، اگر دو ریشه‌ی واحد در فراوانی π در مدل وجود داشته باشد از فیلتر تفاضل‌گیری برای استفاده می‌باشد، این فیلتر را می‌توان به این شکل نوشت:

$$\pi = (1 - L)(1 + L)$$

این فیلتر را می‌توان به این شکل نوشت:

$$\pi = (1 - L)(1 + L)$$
¹. Complex root². Semi-annual³. Annualبرای مثال، اگر دو ریشه‌ی واحد در فراوانی π در مدل وجود داشته باشد از فیلتر تفاضل‌گیری برای استفاده می‌باشد، این فیلتر را می‌توان به این شکل نوشت:⁵. Seasonal Integration

به عبارت دیگر،

فصلی $\{3,4\}$, $\{5,6\}$, $\{7,8\}$, $\{9,10\}$, $\{11,12\}$

تامین این شرایط نشان - ایستا¹ بودن متغیر قیمت ماهانه یک

گوشتی خواهد بود. اما اگر تمامی ریشه زمان در سری زمانی قیمت

ظاهر شود، متغیر دارای گام تصادفی فصلی² این فرآیند به هم انباشتگی فصلی از

(SI(1)) نیز معروف است (2004).

بر این اساس، رد نشدن فرضیه () بیان گر تبعیت سری زمانی $H_0 : \varphi(L) = 1 - L^{12}$

قیمت ماهانه یک گوشتی از فرآیند گام تصادفی فصلی است. در این حالت،

برای ایستا نمودن آن می بایست از تفاضل گیری فصلی $(1 - L^{12}) = \Delta_{12}$

نکته یی که در مورد آزمون BM می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که بنا به نظر

دیکی (1993) زمان وجود ریشه $F_{k,k+1} t_k$ نمی

واحد در تمام فراوانی ها و یا فراوانی های فصلی را بیازماید. از این رو، تیلور (1998)

مشکل آزمون یافت قیسلز و همکاران (1994)

دیگر F . مطابق این رهیافت، برای آزمون نبود ریشه $(F_{2...12} F_{1...12})$

واحد در تمام فراوانی ها در سری زمانی مورد نظر مانند سری زمانی قیمت جوجهی یک

گوشتی، P_t ، فرضیه $\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_{12} = 0$ از طریق آزمون $F_{1...12}$ سنجیده

می . $F_{1...12}$ محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی³ آن باشد، سری زمانی

قیمت جوجهی یک گوشتی دارای ریشهی واحد در تمامی فراوانی . در غیر این

کم یکی از ضرایب π_i این امر بدین معنا است که سری

زمانی قیمت جوجهی یک گوشتی دست کم دارای یک ریشهی واحد فصلی یا

غیر فصلی است. در این صورت، فرضیهی عدم مبنی بر وجود ریشه

¹. Trend Stationary

². Seasonal random walk

· . مقادیر بحرانی این آماره ها حالت استاندارد ندارد و توسط خود تیلور (1998)

اواني های فصلی $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \dots = \pi_{12} = 0$ از طریق آزمون H_0 و فرضیه ریشه‌ی واحد غیرفصلی همانند روش BM از طریق آماره t_1 سنجیده می‌باشد. محاسباتی بیشتر از مقدار بحرانی آن باشد، سری قیمت جوجه $F_{2\dots 12}$ یک گوشتی دارای ریشه‌ی واحد در فراوانی‌های فصلی نیست و طبیعتاً نبود معنی t_1 بیان‌گر وجود تنها یک ریشه‌ی واحد غیرفصلی در سری قیمت است.

کلی، اگر مطالعه‌یی به دنبال آزمون وجود ریشه می‌فراآنی‌ها و یا در تمامی کارگیری رهیافت تیلور (1998) این امکان را فراهم می‌نماید.

در نهایت، با بهره‌گیری از آزمون BM (ین تیلور)، نوع و تعداد ریشه‌های زمانی قیمت ماهانه یک گوشتی قابل شناسایی است و متناسب با آن نوع فیلتر تفاضل‌گیری نیز برای ایجاد سری‌های زمانی ایستا تعیین می‌شود. های ایستاشده ($\Delta_s P_t$) برای پیش‌بینی مقادیر آینده گوشتی بیان اگر نتایج آزمون انجام شده بر سری زمانی قیمت یک فرآیند تصادفی فصلی نایستا باشد، الگوی مناسب برای پیش‌بینی قیمت خودتوضیحی است که اصطلاحاً به الگوی پایه‌ی رگرسیونی معروف است، و دارای شکل ریاضی به صورت معادله (5).

$$\Delta_s P_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta_s P_{t-i} + \varepsilon_t \quad (5)$$

ϕ_i پارامترهای الگو است که باید برآورد گردد، $\Delta_s P_t$ سری قیمت ایستاشده، α_0 نام سری قیمت ایستاشده و ε_t پارامترهای الگو است که باید برآورد گردد،

یکی های پیش‌نها دیگر برای الگوسازی و پیش‌بینی یک سری زمانی فصلی مانند قیمت جوجه‌ی یکی گوشتی، الگوی باکس و جنکینز فصلی (1976). این محققان با استفاده از الگوی خودتوضیحی همی میانگین متحرک فصلی^۱ (SARIMA) های زمانی فصلی که از فرآیند تصادفی فصلی نایستا تعیت می‌نمایند الگوسازی و پیش‌بینی انجام دادند. مطابق این رهیافت، الگوی SARIMA دارای دو جزء فصلی و غیرفصلی . جزء فصلی خود به صورت پارامترهای خودتوضیحی یا میانگین متحرک از وقه فصلی (در این مطالعه از وقه 12) به ترتیب از در P و بخش غیرفصلی نیز همانند ARIMA استاندارد، به صورت پارامترهای خودتوضیحی یا میانگین متحرک از های غیرفصلی از درجه p وارد الگوی (2004). به طور عمومی، یک الگوی فصلی باکس - جنکینز به شکل ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) می‌باشد . در این گیری معمولی $(1-L)^d$ د تفاضل مقدار متغیر از مقدار خود در ماه مشابه سال گذشته $(1-L^{12})^D$ ، است که برای ایستاسازی متغیر اقتصادی مورد مطالعه به کار گرفته می‌باشد . متغیرهای اقتصادی فصلی با یک مرتبه تفاضل گیری فصلی و غیرفصلی (D=d=1) ایستا می‌باشند همکاران، 2004). طور کلی، در روش SARIMA، ابتدا ایستایی متغیر با استفاده از نمودار تابع خودهمبستگی نمونه بررسی می‌شود و متناسب با آن فیلتر تفاضل گیری فصلی و غیرفصلی برای ایجاد سری‌های زمانی ایستا به کار گرفته می‌باشد . - جنکینز، الگوی SARIMA مناسب برای پیش‌بینی این متغیر تعیین می‌شود . در نهایت، با استفاده از پارامترهای الگوی برآورده شده، پیش‌بینی‌های آینده برای متغیر

¹. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) در قالب دو نوع فرم تابعی جمع‌پذیر و حاصل

نشان داده می‌شود. در فرم تابعی جمع‌پذیر پارامتر فصلی به صورت متغیر میانگین متحرک یا خودتوضیحی به الگو اضافه می‌شود. ولی در فرم تابعی حاصل ضرب پارامتر فصلی به صورت متغیر میانگین متحرک یا خودتوضیحی در دیگر متغیرها ضرب می‌شود. به عبارت دیگر، های فصلی و غیرفصلی در الگو لحاظ می‌شوند.

گونه که بیان شد، ممکن است الگوهای مختلفی برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر قیمت ماهانه را داشته باشند. این الگوهای پیش‌بینی از یک مدل اقتصادی، پیش‌بینی یک معیار عملی و کاربردی برای انتخاب الگوی برتر، محاسبه این الگو را می‌دانند. میزان خطای پیش‌بینی الگوهای مختلف، توسط معیارهای متفاوتی فرموله شوند تا از این طریق بتوان دقت پیش‌بینی را مقایسه کرد. یکی از مرسوم‌ترین و پرکاربردترین معیارها، ریشه‌ی دوم میانگین مربعات خطاهای^۱ (RMSE) پیش‌بینی است که به صورت زیر محاسبه می‌شود (دریج، 2003):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2}, \quad e_t^f = P_t - P_t^f \quad (6)$$

که در آن، n تعداد پیش‌بینی در زمان t ، خطای پیش‌بینی در زمان t ، P_t به ترتیب مقدار واقعی و پیش‌بینی P_t^f می‌باشد.

انحراف معیار خطاهای پیش‌بینی است که نسبت به درجهی آزادی تعدیل RMSE را دریج کرده است. هر اندازه که میزان RMSE کم شود، بنا بر این، هر الگوی پیش‌بینی که دارای دست کم

معیار خطاهای پیش‌بینی نیز کم باشد، به عنوان الگوی برتر انتخاب می‌شود.

با توجه به این که در میان استان‌ها شمال غرب کشور، استان آذربایجان شرقی هم از ظ مصرف و هم از لحاظ تولید جوچه‌ی یکی گوشته است.

¹. Root of Mean Square Error (RMSE)


دیگر، نقش مهمی در رهبری قیمت این محصول در منطقه دارد، این استان برای مطالعه موردی انتخاب گردید. های مورد نیاز در این مطالعه شامل قیمت ماهانه یک ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی است که به صورت ماهانه از بانک اطلاعات شرکت پشتیبانی امور دام و طیور کشور و موسسه 1377-88 تهیه گردیده است. جا که اطلاعات ارزشمند یادشده به تفکیک 1377 یور، یعنی سال کشور عملاً بعد از اجرای طرح آزادسازی 1377-88 .
 گفتگویی این مطالعه از زمانی متغیرهای مطالعه گفتنی است مجموعه افزاری به شکل آمده و تعریف شده از قبل وجود ندارد، و می باید توسط فرد برنامه نویسی شود. در این مطالعه از Shazam10.0

نتایج و بحث

(1) روند تغییرات قیمت یک ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی را در سال 1377-88 نشان می . براساس این نگاره، بررسی ظاهری و اولیه روند تغییرات متغیرهای قیم یادشده در این سال‌ها، بازگو کننده ی اساسی در مورد ماهیت ایجاد داده DGP¹) این متغیر است. اول این که، سری‌های قیمت یک ی گوشتی روند رو به رشد دارد، به نحوی که قیمت این محصول 1377-88، به طور میانگین سالانه با نرخ ۱۷/۵٪ افزایش یافته است. بنابراین، روند زمانی، یکی از مولفه‌های اصلی تشکیل ی ماهیت ایجاد داده قیمت ماهانه یک ی گوشتی است. تغییر فصلی در ماهیت ایجاد سری قیم یک ی این محصول

¹. Data Generation Process (DGP)

در استان آذربایجان شرقی در نگاره (1) نشان می‌دهد که اولاً قیمت یک کیلو گوشتی دارای تغییرات فصلی است، به نحوی که در برخی از ماه‌های بیشترین خود و در برخی از ماه‌های کمترین خود قرار دارد. دوم این که الگوی تغییر فصلی قیمت‌های این محصول در طول این 12 سال، یعنی 1377-88



(1). میانگین قیمت ماهانه یک کیلو گوشتی در استان آذربایجان شرقی طی سال 1377-88

پیش‌بینی پایه‌ی رگرسیونی، ابتدا وجود ریشه‌های واحد فصلی و غیرفصلی در سری زمانی قیمت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از آزمون ریشه واحد فصلی BM . مطابق این آزمون، ابتدا معادله‌ی رگرسیونی (3) برای تبدیل لگاریتمی سری زمانی قیمت ماهانه یک کیلو گوشتی از روش OLS تخمین زده سپس، معنی آماره $F_{k,k+1}$ سنجیده شد که

		نتایج آن	(1)
	قیمت	ی یک	همان گونه که در جدول (1)
t_k	BM با مقادیر بحرانی آنها، بیان گر نبود معنی	ی گوشتی، مقایسه	
	%5 . بر این اساس می توان نتیجه گرفت ک		
	زمانی قیمت ماهانه	ی یک	
	این امر بدین معنی است که فرآیند ایجاد داده	ی گوشتی دارای ریشه های واحد در تمامی فراوانی	
	قیمت		
	یک ی گوشتی به صورت یک فرآیند گام تصادفی فصلی است و می بایست با به کار گیری		
	فیلتر تف گیری فصلی، یعنی $L^{12} - \Delta$ این سری را ایستا نمود. به عبارت دیگر، این		
	قیمت همانباشته فصلی از درجه SI(1) . برای اطمینان بیش		
	انباشته فصلی از درجه اول در سری قیمت ماهانه	ی یک ی گوشتی، آزمون	
	تیلو (1998) نیز انجام شد. نتایج آماره		
	$F_{1\dots 12}$ این آزمون نیز همین		
	$F_{2\dots 12}$ $F_{1\dots 12}$		
	نتیجه را تایید می کند.		(1)
	%5 معنی دار نیست. این یافته نشان می دهد که سری قیمت ماهانه		
	ی ها ریشه	.	

(1). نتایج آزمون ریشه‌ی واحد فصلی برای متغیر قیمت یک گوشتی

تیلور		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	O	فرارانی
$F_{2\dots 12}$	$F_{1\dots 12}$	$F_{11,12}$	$F_{9,10}$	$F_{7,8}$	$F_{5,6}$	$F_{3,4}$	t_2	t_1	
4/303	4/173	3/64	3/51	4/01	4/123	1/73	-2/019	-1/66	
25/214	24/354	17/57	17/38	17/73	19/39	25/48	-4/26	-5/27	گیری

$F_{2\dots 12}=6/17$, $F_{1\dots 12}=6/18$, $F_{k,k+1}=7/86$, $t_2=-$ سطح معنی *%1: مقادیر بحرانی در این سطح برابر با- . $t_1=3/21$, $t_1=-3/73$

$F_{2\dots 12}=5/05$, $F_{1\dots 12}=5/09$, $F_{k,k+1}=5/77$, $t_2=-$ سطح معنی **%5: مقادیر بحرانی در این سطح . $t_1=2/65$, $t_1=-3/19$

$F_{2\dots 12}=4/07$, $F_{1\dots 12}=4/27$, $F_{k,k+1}=4/86$, $t_2=-$ سطح معنی ***%10: مقادیر بحرانی در این سطح برابر با- . (فرانسیس و هبایجن، 1997 و تیلور، 1998) $t_1=2/36$, $t_1=-2/91$

: یافته‌های تحقیق

برای اطمینان از ایستا بودن سری BM دوباره برای این داده t_k گیری براساس این جدول، همه نتایج در جدول (1).

این %5 معنی ی آزمون تیلور در سطح احتمال BM $F_{k,k+1}$. این گیری شده است. پس از ایستاسازی سری زمانی

قیمت ماهانه‌ی گوشت مرغ زنده با فیلتر تفاضل گیری فصلی ($L_s^{12} = 1 - \Delta_s^{12}$), الگوی پایه رگرسیونی برای این سری برآورد گردید.

رگرسیونی به روشی که در فصل روش‌شناسی بازگو شده است، صورت گرفت. در نهایت ی پایه‌ی رگرسیونی قیمت ماهانه یک گوشتی با لحاظ نمودن یک

ی غیرفصلی از درجه‌ی اول و دوم برآورد گردید. نتایج

ی فصلی از درجه 12

(2)

2). برآورد ضرایب الگوی پایه‌ی رگرسیونی برای قیمت ماهانه یک‌روزه گوشته

$(1 - L^{12})LnP_t = 0/095 + 0/782(1 - L^{12})LnP_{t-1} - 0/156(1 - L^{12})LnP_{t-2} - 0/353(1 - L^{12})LnP_{t-12}$	
(3/77) ^a	(10/13)
$F_{ser} = 0/215 (0/415)^b$	$ARCH(1) = 0/102 (0/749)$
$F_{12} = 0/845 (0/605)$	$ARCH(12) = 9/61 (0/65)$

:a t محاسباتی برای هر یک از ضرایب برآورد شده در داخل پارانتر گزارش شده است. b: سطح معنی

: یافته‌های تحقیق

(2)، مقایسه‌ی مقادیر آماره t محاسباتی با مقدار بحرانی نشان می‌دهد که

ی ضرایب برآورده از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% معنی

معنی () ARCH(q) LM(q)

های بالا به ترتیب بیان گر نبود خودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی شرطی از

ی اول و دوازده در اجزای اخلاق این معادله در سطح احتمال 5% .

براساس الگوی پایه‌ی رگرسیونی برآورده از قیمت گوشت مرغ زنده در ج

رفتار قیمت یک ی گوشته متاثر از سه بخش از تغییرات قیمت

ی قیمت مربوط به ماه بخش اول این تغییرات، یعنی $(1 - L^{12})LnP_{t-1}$

گذشته، بخش دوم این تغییرات، $(1 - L^{12})LnP_{t-2}$ قیم-

$(1 - L^{12})LnP_{t-12}$ ، مربوط به نرخ رشد قیمت ماه مورد نظر در

سال گذشته نسبت به همان ماه در سال پیش از آن است. به عبارت دیگر، نرخ رشد قیمت

یک ی گوشته در هر ماه هم متاثر از نرخ رشد قیمت یک و دو ماه گذشته و

متاثر از نرخ رشد قیمت ماه مشابه سال گذشته است. تأثیرپذیری قیمت جوجه

یک ی گوشته در هر ماه از قیمت ماه مشابه در سال گذشته، بدین معنی است که قیمت

یک گوشتی در طول سال تحت تاثیر رفتار تقاضای فصلی تولیدکنندگان است که این رفتار خود را به صورت فصلی از قیمت (

می . یک و دو در الگوی یادشده، بدین مفهوم است که قیمت جوجه یک گوشتی در هر ماه تحت تأثیر مقدار عرضه و تقاضای گوشت مرغ در یک و دو ماه گذشته، و در نتیجه قیمت آن در این یک و دو ماه قرار می‌گیرد. های یک، دو و یک گوشتی در الگوی پایه‌ی رگرسیونی

(2)، مطابق انتظارهای قبلی و قابل توجیه است. براساس ضرایب برآورده شده برای الگوی پایه‌ی رگرسیونی جوجه یک گوشتی در جدو (2) تاثیرپذیری قیمت هر ماه از سه بخش یادشده یکسان نیست، به‌طوری که تاثیر نرخ رشد قیمت (0/157) بیش از مجموع اثر رشد قیمت در دو ماه گذشته (0/782)

. (0/353)

البته، برای الگوسازی و پیش‌بینی قیمت یک گوشتی پایه‌ی رگرسیونی یادشده، از الگوهای باکس - جنکینز فصلی (SARIMA) نیز استفاده شده، و دقیقت و توانایی دو الگوی یادشده در برابر هم سنجیده شده است. یافته باکس - جنکینز، سری قیمت ماهانه یک گوشتی با استفاده از فیلتر گیر اول فصلی و غیرفصلی ($D=d=1$)، ایستاسازی گردید.

پذیر، SARIMA، در الگوی اولیه PACF SACF

های متغیرهای خودتوضیحی و میانگین متحرک تعیین شده، و یک بار به همراه متغیر خودتوضیحی فصلی از درجه‌ی یک $[ARIMA(p,1,q)(1,1,0)_{12}]$ و بار دیگر با لحاظ کردن متغیر میانگین متحرک فصلی از درجه $[ARIMA(p,1,q)(0,1,1)_{12}]$.

برای تمامی الگوهای برآورد شده، مقادیر آماره Q-باکس در برخی از های غیرفصلی مانند 6 های فصلی 12 در حقیقت،

در هر دو فرم تابعی، انتخاب الگوی مناسب براساس مراحل سه گانه‌ی باکس - جنکینز یعنی

شناسایی وقفعه‌های پارامترهای خودتوضیحی (p) و میانگین متحرک (q) بر پایه‌ی بررسی نمودارهای خودهمبستگی‌های جزیی و نمونه، تخمین الگو با استفاده از روش بیشترین نمایی و کنترل تشخیصی اجزای اخلال توسط آماره‌ی باکس-پیرس (Q)

خودهمبستگی جزیی و هم \pm

پس از انجام مراحل پیش‌گفته، الگوی نهایی فرم تابعی جمع‌پذیر با الگوی نهایی فرم تابعی ضرب مقایسه، و در نهایت الگوی برتر برای پیش‌بینی با توجه به نتایج آزمون Q

-باکس، یعنی نبود خودهمبستگی سریالی و کمترین مقادیر معیارهای AIC SBC

شناسایی گردید. بر این اساس، فرم تابعی حاصل ضرب به عنوان فرم برتر انتخاب شد. این

الگو برای هر سری قیمت جوجه یک‌روزه دارای تصریح $ARIMA(2,1,1)(0,1,1)_{12}$

نتایج تخمین آن در جدول (3)، سطح معنی (3)

آماره باکس-پیرس در وقفعه (Q(p))

ی نبود خودهمبستگی سریالی در

. براساس اطلاعات این جدول، دیده می‌شود که %5

اثر تغییرات فصلی به صورت یک متغیر میانگین متحرک فصلی الگوسازی شده است.

عبارت دیگر، رفتار فصلی قیمت ماه جاری جوجهی یک ی گوشتشی تحت تاثیر مجموعه

عوامل تصادفی شکل گرفته در همان ماه در سال گذشته است.

(3). برآورد ضرایب الگو SARIMA ضرب برای قیمت ماهانه

یک ی گوشتشی

$(1 - 1.011L + 0.517L^2)(1 - L)(1 - L^{12})LnPD_t = (1 + 0.871\epsilon_{t-1})(1 + 0.713\epsilon_{t-12})$				
(9/42)	(-5/08)	(12/57)	(21/84)	
Q(6)=3/22 (0/359)	Q(12)=10/85 (0/211)	Q(24)=31/6(0/51)	AIC=-2/491	SBC=-2/374

: یافته‌های تحقیق

برای انتخاب الگوی پیش‌بینی برتر برای سری قیمت جوجه‌ی یک ریشه دوم میانگین مربعات خطاهای (RMSE) برای هر یک از الگوهای پیش‌بینی در نظر گرفته های یک، دو، چهار، شش و هشت ماه به جلو محاسبه گردید. بدین منظور، الگوهای پیش‌بینی در نظر گرفته شده با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1377-85 گردید و با استفاده از آن‌ها پیش‌بینی‌های یک، دو، چهار، شش و هشت ماه به جلو برای سپس با مقایسه‌ی قیمت‌های واقعی جوجه‌ی یک 1386-88 گوشته در سال 1386-88 با مقادیر پیش‌بینی شده ها، خطاهای پیش‌بینی به با استفاده از این اطلاعات، معیارهای ریشه‌ی دوم میانگین مربعات خطاهای (RMSE) .

(4) هر یک از الگوهای پیش‌بینی در نظر گرفته شده محاسبه گردید. نتایج آن

4). میزان RMSE در پیش‌بینی های پایه‌ی رگرسیونی و SARIMA :

افق پیش‌بینی					سری قیمت
				یک ماه	
79	60	54	32	21	پایه‌ی رگرسیونی
979	890	867	216	231	ARIMA(2,1,1)(0,1,1) ₁₂

: یافته‌های تحقیق

(4)، در الگوی پایه‌ی رگرسیونی برآورد شده برای سری قیمت جوجه‌ی یک ریشه دوم میانگین مربعات خطاهای (RMSE) یا انحراف معیار خطاهای پیش‌بینی برای نمونه برای پیش‌بینی‌های یک ماه بعد 210 ریال، دو ماه بعد 320 ریال و برای هشت ماه بعد 790 ریال این در حالی است که مقدار معیار RMSE های یادشده به ترتیب 231 و 216 ریال است. بنابراین، ملاحظه می‌گردد معیار RMSE برای الگوی پایه‌ی رگرسیونی در مقایسه با الگوی SARIMA ضرب در تمامی گام () دارای مقادیری به

مراتب کم . بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که الگوی پایه‌ی رگرسیونی توانایی پیش بینی صحیح مقادیر آینده قیمت ی یک ی گوشتی . البته برای سنجش معنی دار بودن تفاوت میان خطاهای پیش بینی این دو گزینه از لحاظ آماری، از روش پیش دایبولد و ماریانو¹ (1995) . ۵/۶۵ - که در مقایسه با مقدار بحرانی جدول Z (2/32) %1 لحاظ آماری معنی دار است، و فرضیه‌ی عدم مبنی بر برابر با صفر بودن میانگین تفاضل خطاهای پیش بینی دو گزینه رد می . بنابراین، الگوی پایه‌ی رگرسیونی به عنوان الگوی برای پیش بینی قیمت مقادیر آینده قیمت ماهانه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ی یک ی گوشتی برای ماه ۱۳۹۰ استان آذربایجان شرقی با استفاده از این الگوی پایه‌ی رگرسیونی پیش بینی گردید. نتایج آن . (5)

(5). پیش بینی قیمت ماهانه ی گوشتی استان آذربایجان شرقی
ی یک (/ریال) :) ۱۳۸۸-۹۰

						شهریور		تیر		اردیبهشت	فروردین	/
5667	5738	4607	5111	5266	4745	4442	4336	4220	4456	7045	7551	1389
10529	10293	7782	5678	7758	7049	4567	6576	7658	4730	5912	5591	1390

: یافته‌های تحقیق

. در این روش، تفاضل خطاهای پیش بینی دو گزینه در افق‌های پیش بینی متفاوت محاسبه شده و میانگین این تفاضل (\bar{d}) می . سپس فرضیه $H_0: \bar{d} = 0$ که دارای توزیع نرمال استاندارد است، سنجیده می . (91 2004)

برای مقایسه روند قیمت‌های پیش‌بینی شده با روند قیمت‌های واقعی، روند تغییرات قیمت

یک گوشتی با استفاده از قیمت‌های واقعی در سال 1377-88

همراه قیمت (2) ترسیم 1390 1389 1380 1379 1378 1377


چین منحنی، روند قیمت یک گوشتی را .

1377-88 و قسمت خط متعدد منحنی روند قیمت‌های پیش‌بینی شده

یک 1390 نمایش می‌براسد این نگاره می‌توان نتیجه

گرفت که روند قیمت یک پیش‌بینی شده برای دو سال آینده با روند قیمت‌های واقعی

ها پیش از آن همخوانی دارد.



(2). میانگین قیمت ماهانه‌ی واقعی و پیش‌بینی شده یک گوشتی

استان آذربایجان شرقی در سال 1377-90

نتیجه‌گیری و پیش

گونه که عنوان شد، الگوی پایه‌ی رگرسیونی در مقایسه با الگوهای SARIMA

مناسبی برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده یک گوشتی است. با توجه به ماهیت

این الگو، بهره‌گیری های اجرایی دولت و بخش خصوصی به خوبی امکان‌پذیر . از این رو، با استفاده از این الگو می‌توان قیمت ی یک ی گوشتی در سال آینده را پیش‌بینی نمود و بر اساس این اطلاعات قیمتی برنامه‌ریزی بهتری برای مدیریت بازار از طرف دیگر، تولیدکنندگان گوشت مرغ نیز می‌گیری از این الگو، قیمت ی یک ی گوشتی را برای ماههای آینده پیش‌بینی نمایند و برنامه ریزی را طوری تنظیم نمایند تا گوشت تولیدی را در زمان مناسب وارد بازار کنند، و از این طریق درآمد خود را افزایش . این امر تا حدودی باعث ثبات قیمتی و در نوع خود باعث افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد.

با توجه به روند تغییرات قیمت ی یک ی گوشتی، انتظار می‌رود که نوسان‌های قیمت ماهانه آینده بیش این مساله اهمیت بسیار دارد، زیرا با توجه به وضعیت نابسامان فعلی داری استان و کشور، افزایش قیمت جوجه‌ی یک ی گوشتی موجبات افزایش ناپایداری و خطر درآمد تولیدکنندگان جوجه‌ی یک ی گوشتی، و به تبع آن درآمد ندگان مرغ گوشتی را فراهم خواهد نمود. در نتیجه، این بی‌ثباتی در نوع خود در بخش مصرف، رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس توصیه می‌گردد که های مربوط پیش‌بینی‌هایی را برای مدیریت بازار و مدیریت خطر قیمت جوجه یک ی گوشتی فراهم نمایند.

این مقاله از طرح پژوهشی دانشگاه تبریز استخراج شده است. بدین وسیله بر خود لازم می‌دانم که از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز و تمامی افرادی که به نوعی در انجام آن همکاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

- سلامی، ح. «حسینی، س. . و یزدانی، س. (1388). بیمه کاری برای کاهش خطر تولید و نوسان‌های قیمت در صنعت طیور کشور. کشاورزی 3(4): 30-1.
- شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بانک اطلاعاتی قیمت برخی از فرآورده و طیور (1377-88) ریزی، بودجه و تشکیلات، وزارت جهاد کشاورزی.
- تدوین الگوی بیمه‌ی درآمد برای صنعت طیور گوشتی در ایران. (1387).
- پایانی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
- در ایران: و سلامی، ح. (1387). الگوی پیش‌بینی قیمتی علوم کشاورزی ایران 2(28): 1-28.
- کشاورز حداد، غ. (1385). تحلیل اثرهای تقویمی در نوسان‌های قیمت برخی از کالاهای اساسی (): های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ. ی تحقیقات اقتصادی 73: 328-295.
- Beaulieu, J. J. and Miron, J. A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S. data. *Journal of Econometrics*, 55: 305-328.
- Boswijk, H. P. and Franses, P. H. (1996). Unit roots in periodic autoregressions. *Journal of Time Series*, 17: 221-245.
- Boswijk, H. P. and Franses, P. H. (1995). Testing for periodic integration. *Economics Letters*, 48: 241-248.
- Brendstrup, B., Helleberg, S., Nielsen, M., Skipper, L. and Stentoft, L. (2004). Seasonality in economic models. *Macroeconomic Dynamics*, 8: 362-394.
- Canova, F. and Hansen, B. E. (1995). Are seasonal patterns constant over time? A test for seasonal stability. *Journal of Business and Economic Statistics*, 13: 237- 252.
- Darne, O. and Diebolt, C. (2002). A note on seasonal unit root tests. *Quality and Quantity*, 36: 305-310.
- Dickey, D. A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S. data. *Journal of Econometrics*, 55: 329-331.

Enders, W.(2004 .)Applied econometrics time series. Second edition, John Wiley and Sons, Inc.

Franses, P. H. (1995). The effects of seasonally adjusting a periodic autoregressive process. Computational Statistics and Data Analysis, 19: 683–704 .

Franses, P.H. (1991). Seasonality, non-stationary and the forecasting of monthly time Series. International Journal of Forecasting, 7: 199-208.

Franses, P. H. and Hobijn, B. (1997). Critical values for unit root tests in seasonal time series. Journal of Applied Statistics, 24: 25- 47.

Franses, P. H. and Paap, R. (2004). Periodic time series models: Advanced texts in Econometrics. Oxford University Press.

Ghysels, E. and Osborn, D. R. (2001). The Econometric Analysis of Seasonal Time Series. Cambridge University Press.

Ghysels, E., Lee, H. S. and Noh, J. (1994). Testing for unit roots in seasonal time series: some theoretical and extensions and a Monte Carlo investigation. Journal of Econometrics, 62:415-442 .

Hylleberg, S. (1995). Tests for seasonal unit roots: General to specific or specific to general?. Journal of Econometrics, 69: 5-25.

Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W. J. and Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics, 99: 215-238.

Koc, E. and Altinay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management, 28: 227–237.

Lim, C. and McAleer, M. (2000). A Seasonal analysis of Asian tourist arrivals to Australia. Applied Economics, 32: 499-509.

Osborn, D. R. (2004). Unit root versus deterministic representations of seasonality for forecasting. 18th chapter. in: M. P. Clements and D. F. Hendry (eds). A companion to economic forecasting, Blackwell publishing.

Osborn, D. R., Heravi, S. and Birchenhall, C. R. (1999). Seasonal unit roots and forecasts of two-digit European industrial production. International Journal of Forecasting, 15: 27- 47.

Rodrigues, P. M. M. and Osborn, D. R. (1999). Performance of seasonal unit root tests for monthly data. Journal of Applied Statistics, 26(8): 985–1004.

Rodrigues, P.M.M. and Franses, H. P. (2005). A sequential approach to testing seasonal unit roots in high frequency data. *Journal of Applied Statistics*, 32(6): 555-569.

Taylor, A. M. (1998). Testing for unit roots in monthly time series. *Journal of Time Series Analysis*, 19(3): 349-368 .

Wooldridge, J. M. (2003). *Introductory Econometrics, A Modern Approach*. Second edition, South-Western College Publishing.